

Des symptômes que nous ne sommes plus habitués à reconnaître apparaissent sur les parcelles de cépages résistants. Cette fiche synthétise les symptômes caractéristiques de l'anthracnose, de l'excoriose et du black rot sur feuilles et sur rameaux herbacés.



► Maladie rare aujourd'hui, très sensible aux fongicides. ► Symptômes facilement confondus avec ceux de l'excoriose. ► Sur feuilles, petites taches de quelques millimètres le plus souvent le long des nervures, avec parfois déformation du limbe. ► Touche préférentiellement les tissus jeunes (feuilles et apex). ► Nécrose des tissus, la feuille présente un aspect criblé. ► Sur rameaux et pétioles, lésions localisées, étendues en surface et en profondeur qui s'éclaircissent en leur centre.



► Premiers symptômes au printemps à la base des jeunes rameaux. ► Lésions peu étendues, allongées et sombres, qui finissent par confluer, s'éclaircir et fragiliser les tissus. ► Sur feuilles les symptômes semblables à l'anthracnose. Petites taches sombres disposées le long des nervures, parfois entourées d'un halo jaunâtre et des déformations. ► Présence de pycnides.



► Originaire d'Amérique du Nord. ► Sur feuilles taches circulaires pouvant atteindre un centimètre, gris-brun puis brun avec un liseré noir, pycnides bien visibles (flèches). ► Symptômes sur rameaux moins fréquents que sur vrilles, pétioles et pédoncules. Lésions chancreuses allongées brunes à noires, parsemées de pycnides.