Taranis

(référence obtenteur : INRAC-0396P)

Variété de cuve de la série INRAE-ResDur3, à résistance polygénique au mildiou (*Rpv1 + Rpv3.1 + Rpv3.3 + Rpv10*) et à l'oïdium (*Run1 + Ren3 + Ren9*)



Origine / Filiation

Taranis = IRAC-1933 x Voltis

Obtenteurs : Agroscope (Suisse) et INRAE (France)

IRAC-1933C : Obtention Agroscope, issue du croisement Bronner x Cornalin du Valais. Elle porte des facteurs de résistance provenant de vignes américaines et asiatiques (*V.amurensis*).


Voltis : Variété sélectionnée en 2018 par INRAE Grand Est – Colmar. Elle porte des facteurs de résistance provenant de vignes américaines (*V. aestivalis, V. rupestris* et V. *rotundifolia).*

Taranis a été inscrit au catalogue officiel en **février 2026**

Aptitudes viticoles

Phénologie

Date de débourrement ***(moyenne sur 3 ans)*** **Date de récolte** ***(moyenne sur 3 ans)***




Débourrement tardif, 10 jours après le Gamay. Maturité 3ème époque, 3 semaines après le Gamay

Vigueur et production

Variété de vigueur moyenne, avec des rameaux à port semi-érigé. **Taranis** à un potentiel de production moyen à élevé, moyennement fertile, avec de grosses grappes compactes.

Rendement en % du témoin ***(moyenne sur 3 ans)***



INRAE Grand Est Colmar
UMR Santé de la Vigne et Qualité du Vin
28 rue de Herrlisheim
68000 Colmar
Tél 03 89 22 49 00

Conception et réalisation :
Vincent Dumas
Guillaume Arnold

Décembre 2025


Taranis

Paramètres œnologiques


Richesse en sucres et acidité des raisins

A maturité, la richesse en sucres et l'acidité totale sont équivalentes aux cépages témoins.

Titre alcoométrique potentiel *(moyenne sur 3 ans)*



Acidité totale en ac. sulf. *(moyenne sur 3 ans)*



Qualité du vin

Aptitude à l'élaboration de vins rouges, d'un bon niveau qualitatif, structurés, fruités, avec des tanins charpentés et une intensité colorante élevée.

Résistance aux maladies fongiques

Mildiou

Rares symptômes sur inflorescences ou grappes, sans incidence sur la récolte, alors que les cépages témoins non traités sont fortement impactés. Présences de petites nécroses sur feuillage en cas de forte pression.

Oïdium

Résistante totale, observée sur tous les sites, même en présence d'une forte pression.

Black rot

Taranis ne porte pas de facteurs de résistance connu au black rot. En situation de risque, une protection fongicide est indispensable. En l'état actuel des connaissances basées sur un petit nombre d'essais, deux traitements positionnés autour de la floraison sont suffisants pour éviter les dégâts sur grappes et les pertes de récolte.

Botrytis

Potentiellement sensible à la pourriture du fait de la compacité des grappes

Economie potentielle en fongicides

Taranis est doté d'une résistance polygénique, constitué de quatre facteurs de résistance au mildiou et trois facteurs de résistance à l'oïdium. Afin de préserver ces facteurs de résistance, en l'état actuel des connaissances, il est indispensable de réaliser un **minimum de 2 traitements fongicides** contre le mildiou et l'oïdium. Cette protection doit être modulée à la hausse en cas de forte pression de la maladie. L'économie en fongicides se situe entre 80% et 90% par rapport à une variété sensible.

ÉCOPHYTO RÉDUIRE ET AMÉLIORER L'UTILISATION DES PHYTOS

Variété éligible au dispositif des Certificats d'Economie de Produits Phytopharmaceutiques (CEPP).

Remerciements :

L'acquisition des données de valeur agronomique, technologique et environnementale, synthétisées dans cette fiche, a bénéficié d'un soutien financier de la CTNSP, de l'IFV et d'Agri-Obtentions. La partie expérimentale a été menée au sein d'un partenariat entre INRAE , Agroscope, l'IFV et un organisme régional (Site 1 : CA Vaucluse, Site 2 : Sicarex Beaujolais et Site 3 : Agroscope (Valais)).

Renseignements :

Techniques : INRAE Colmar guillaume.arnold@inrae.fr - vincent.dumas@inrae.fr,

Plants : IFV Le Grau du Roi anastasia.rocque@vignevin.com - laurent.audeguin@vignevin.com