Bronner B

Origine

Geisenheim 6494

x

Merzling

=


BRONNER B

Obtention en 1975 en Allemagne
Classée définitivement en France depuis le 19 avril 2017



La proximité sensorielle

Un vin dégusté



Le vin dégusté se rapporche du Chardonnay.

Le profil analytique

Un vin analysé

Degré (%vol)	12,9
Sucres (g/L)	0,6
Acidité Totale (g/L H_2SO_4)	3,8
Acidité Volatile (g/L H_2SO_4)	0,18
pH	3,37
CO2(g/L)	1,1
Coordonnées tristimulaires	
L	98,91
a	-0,69
b	4,51

La caractérisation sensorielle

Un vin degusté

Par rapport au Chardonnay

-		+
Gras		Acide
Rond		Aromatique



DONNÉES OBTENUES DANS LE CADRE DU PROJET CIVARE

Caractérisation sensorielle des Innovations VAriétales Résistantes Européennes classées en France
Financé par FranceAgriMer

IFV INSTITUT FRANÇAIS DE LA VIGNE ET DU VIN

FranceAgriMer

Automne 2018 - Création IFV - Crédit photos : VIVC

La phénologie du Bronner B





ÉPOQUE DE DÉBOURREMENT : Précoce, débourrement avant le Chardonnay et le Pinot noir.


ÉPOQUE DE MATURITÉ : Moyen, maturité similaire au Gamay en Suisse et après le Pinot Blanc en Autriche et en Allemagne.


Phénologie observée dans les régions suivantes : Allemagne (Pays de Bade), Autriche (Styrie), Suisse (Zürich)

Les stades phénologiques indiqués, débourrement et maturité, résultent d'une synthèse des données d'observations provenant de différents pays.

La transposition directe des données d'observation sous nos climats étant incertaine, nous avons préféré diffuser les données brutes en mentionnant la ou les régions où ont été faites les observations. Les stades sont exprimés par rapport à un cépage de référence régional ou en données calendaires.

La figure ci-contre reprend, à titre indicatif, les données phénologiques des différents cépages de référence, observés au Domaine de Vassal (Hérault).





Les aptitudes agronomiques du Bronner B

RENDEMENT : 10 à 20 t/ha


VIGUEUR : Forte

STRATÉGIE PHYTOSANITAIRE : 0 à 2 traitements

Le schéma suivant résume le degré de résistance du cépage aux trois maladies cryptogamiques, que sont le mildiou, l'oïdium et le botrytis sur grappe et/ou sur feuille. Sur chaque feuille ou grappe figurent les notes minimale, maximale et médiane de résistance du cépage.

Les notations minimales, maximales et médianes sont issues de données bibliographiques et de notations effectuées par l'ICV en 2012 sur des parcelles dans les pays suivants : Allemagne, République tchèque, Autriche, Roumanie et Hongrie.

Les grilles de l'Organisation Internationale de la Vigne et du vin (OIV) spécifiques à chaque combinaison «organe végétatif» et «maladie» ont été utilisées pour la notation des dégats.



Tous droits réservés - Groupe ICV - www.icv.fr